

### Surveiller la zone de morsure durant 30 jours.

- › Une petite plaque apparaissant immédiatement ou dans les 24 premières heures est une réaction normale.
- › Une simple morsure de tique sans symptômes ne nécessite pas de traitement.

### QUAND FAUT-IL VOIR UN MÉDECIN?

Si apparition de symptômes comme :

- › Une plaque rouge caractéristique au niveau de la morsure (ou ailleurs) entre 3 et 30 jours après la morsure (érythème migrant)
- › Fièvre prolongée inexplicée.
- › Fatigue anormale.
- › Douleurs articulaires diffuses.
- › Maux de tête, asymétrie au niveau du visage.



## MORSURE DE TIQUES INFORMATIONS AUX PARENTS

### Secrétariat Urgences pédiatriques

☎ : (+352) 4 411 6148

### Secrétariat Pédiatrie

☎ : (+352) 4 411 3147

### Secrétariat Chirurgie pédiatrique

☎ : (+352) 4 411 6109

MORSURE DE TIQUES Informations aux parents - Février 2022

## MORSURE DE TIQUES

INFORMATIONS AUX PARENTS



 Centre Hospitalier de Luxembourg  
**KANNERKLINIK**

CHL KannerKlinik  
4, rue Ernest Barblé L-1210 Luxembourg  
Tél : +352 44 11 31 33 Fax : +352 44 11 38 02 [www.chl.lu](http://www.chl.lu)



 **KANNERKLINIK**

## QU'EST-CE QU'UNE TIQUE?

- Il s'agit d'un parasite appartenant à la famille des acariens.
- Les tiques se rencontrent surtout dans les forêts et se trouvent sur les feuillages et les hautes herbes. La plupart du temps on remarque la présence d'une tique accrochée sur la peau au retour d'une promenade.
- Elles apparaissent surtout du printemps jusqu'à l'automne.
- Prévention: vêtements à manches longues, **protection de la tête (casquette/chapeau), chevilles et pieds (chaussettes, chaussures fermées)** lors des balades en forêt, produits répulsifs (**à utiliser en fonction des recommandations**)



## › QUEL EST LE DANGER D'UNE MORSURE DE TIQUE?

La morsure de tique peut transmettre plusieurs maladies mais les 2 principales en Europe sont:

- › **La borréliose ou maladie de Lyme:** elle est causée par une bactérie et peut se manifester par une plaque rouge caractéristique (érythème migrant, 3-30 jours après la piqûre) mais peut aussi donner des tableaux plus graves.
- › **La méningoencéphalite à tiques:** elle est causée par un virus. Aucun cas n'a été déclaré jusqu'à ce jour au Luxembourg. Un vaccin existe pour les départs vers une région contaminée.



## › COMMENT ENLEVER UNE TIQUE?

- 1 Ne pas appliquer de produits désinfectants ou autres sur la tique avant de l'enlever.



- 2 Enlever la tique avec une pince à tiques dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



- 3 Contrôler si tique enlevée entièrement.

- 4 Par la suite désinfecter la zone de morsure.